



## Wichtige Hinweise !

### PL-UNTERSUCHUNG

<b>Erstuntersuchung</b>	Das Mindestalter für die Vorsorgeuntersuchung ist 12 Monate.
<b>Nachkontrolle</b>	Die Nachkontrolle ist nötig bei Grad 1 + 2 und muss im Alter von 3 Jahren bzw. bei Hündinnen nach dem 3. Wurf erfolgen.
<b><u>Keine</u> Vorsorgeuntersuchung durchführen bei</b>	Läufigkeit – Trächtigkeit - Scheinträchtigkeit

### Zuchtvoraussetzungen

<b>Grad 1 + 2</b>	Hunde mit PL 1 + 2 dürfen mit einem über 3 Jahre alten, nachkontrollierten, luxationsfreien Partner verpaart werden.
<b>Grad 3 + 4</b>	Hunde mit PL 3 + 4 werden nicht zur Zucht zugelassen.

### Gradeinteilung nach Putnam (1968)

<b>Grad 1</b>	Kniescheibe lässt sich manuell luxieren, springt aber danach sofort zurück.
<b>Grad 2</b>	Kniescheibe lässt sich manuell luxieren, bleibt dann in dieser Position, kann aber durch Manipulation des Beines wieder in die richtige Position zurück verlagert werden.
<b>Grad 3</b>	Kniescheibe ist kurzfristig oder dauerhaft luxiert, lässt sich aber manuell in die richtige Position bringen.
<b>Grad 4</b>	Kniescheibe ist permanent luxiert und lässt sich nicht in die richtige Position bringen

Die Untersuchung ist grundsätzlich im wachen Zustand vorzunehmen. Die Gradeinteilung erfolgt nach Putnam (1968).

Für die Befunderhebung ist das schlechtere Gelenk ausschlaggebend.

Wird am stehenden Hund, die Kniescheibe nur einmal in luxierter Stellung gefunden, erfolgt eine Einteilung in Grad 3, auch wenn eine Reposition alleine durch Manipulation der Gliedmaßen möglich ist.

Hunde, bei denen die Kniescheibe auf den inneren oder äußeren Rollkamm liegt (so genannte reitende Patella), gelten als „Patella Luxation Grad 0“.